

TUBERCULOSIS PULMONAR en Pereira durante 1998 - 1999

Karla Liliana Cortez Medina
Lizeth Katherine Gutiérrez Rivera

Facultad de Terapia Respiratoria

Resumen

La tuberculosis continúa siendo un importante problema de salud pública en el mundo; la epidemia ha tenido una dinámica especial con la frecuencia de exposición al virus del SIDA de algunas personas. El Instituto Municipal de Salud de Pereira presta servicio de diagnóstico, control y tratamiento y está en el proceso de descentralización de la atención de pacientes, conservando el servicio de referencia para la Red de Atención Primaria. La población estuvo constituida por todos los pacientes diagnosticados con tuberculosis pulmonar y pleural en el consultorio de vías respiratorias, durante el año 1998-1999. Se encontró que ésta es principalmente una enfermedad de hombres adultos y jóvenes; obreros y desempleados.

Introducción

La tuberculosis continúa siendo un importante problema de salud pública en el mundo. Se considera que una tercera parte de la población mundial se encuentra afectada; cada año aparecen 8 millones de nuevos casos y fallecen cerca de 3 millones, de las personas que adquieren esta enfermedad. (1)

En el ámbito mundial en los países desarrollados se ha observado una tendencia decreciente de la mortalidad, mientras la morbilidad aumenta con la edad, la pobreza y las ciudades. (2)

Una vez que la bacteria se introduce en el pulmón se forma un granuloma, infección primaria de la TBC; este proceso produce síntomas que en el 95% de los casos se recupera sin problema; luego la bacteria de la TBC pasa a una fase de inactividad encerrada en el granuloma y si por cualquier causa (otras infecciones, SIDA, CA, estrés) las defensas del cuerpo se debilitan, las bacterias se reactivan y producen enfermedad. (2)

El agente infeccioso M. Tuberculosis se trasmite por la inhalación de gotitas infecciosas eliminadas al aire por la tos y el estornudo del paciente infectado. (2)

